

분만 후 소모된 기력, 피로, 식욕부진,
질병 스트레스의 빠른 회복을 위한

특수 한방 처방

선천 면역 증진을 통한 항바이러스 활성
해열 · 진통 · 자양강장 · 식욕증진



효과

포유모돈 총사료섭취량 증대
산후 문제 및 면역력 개선
다음주기 번식성적 향상(재귀발정 및 분만율)
포유량 극대화
포유자돈 일당증체량 개선
이유 두수 및 체중 증가
이유 후 육성을 개선

용법 및 용량

분말

후보돈, 임신돈 : 사료 톤당 2kg 이상 (0.2%)
포유돈 : 사료 톤당 2~4kg 이상 (0.2~0.4%)
이유자돈 : 사료 톤당 2kg 이상 (0.2%)
육성, 비육돈 : 사료 톤당 2kg 이상 (0.2%)

액상

모돈 1회당 10~20ml(2~3회/일)

활력 에쓰

엄마가
잘 먹어야
자돈이
건강합니다.



분만 후 지친 모돈을 위한 활력에쓰

바이러스 감염(PRRS,circo,influenza등)스트레스

세균 감염 스트레스

발열,염증 스트레스

분만 및 난산 스트레스

백신 스트레스




초기 사료섭취량 저하

- ▶ 유 생산량 감소
- ▶ 낮은 일당증체
- ▶ 이유 전 폐사율 증가
- ▶ 이유 후 육성율 저하
- ▶ 다음 주기 WFSI 증가(Weaning-to-first service interval)
- ▶ 다음 주기 분만을 저하


분만 후 3일간이
포유기간 **총 사료섭취량**을 결정합니다.

사료섭취량이 번식성과 일당증체량에 미치는 영향



*PIC Nutrition Summit 2020, Internal research

포유기간 총 사료섭취량이 현재와 다음 주기 번식성적에 미치는 영향



사료급여 패턴에 따른
현재 주기에서(current cycle) 번식 성적

Pattern	1-HH	2-MH	3-HM	4-MM	평균	5-LL	평균과차이
총산자수	16.5	16.9	16.4	16.8	16.7	16.7	0.1
생존자돈수	14.7	14.8	14.7	14.5	14.7	13.2	-1.5
이유두수	11.5	11.0	10.9	10.9	11.1	9.99	-1.1
이유전폐사율(%)	15.9	14.9	15.8	15.9	15.6	16.9	1.3
일평균사료섭취량(kg)	7.6	6.9	6.4	5.8	6.7	4.3	-2.3

다음 주기에서(following cycle) 번식 성적

Pattern	1-HH	2-MH	3-HM	4-MM	평균	5-LL	평균과차이
이유-수정 간격(일)	6.34	5.93	6.55	6.5	6.3	13.1	6.8
분만율(%)	91.0	89.8	89.6	92.6	90.8	75.0	-15.8
총산자수	17.4	17.7	17.4	19.9	18.1	16.3	-1.8
생존자돈수	14.8	15.1	15.1	14.7	14.9	13.6	-1.3

1-HH : 일평균 7.6kg HIGH,HIGH(첫주동안 높은 섭취량 / 나머지 기간동안 높은 섭취량)
 2-MH : 일평균 6.9kg MEDIUM,HIGH
 3-HM : 일평균 6.4kg HIGH,MEDIUM
 4-MM : 일평균 5.8kg MEDIUM,MEDIUM
 5-LL : 일평균 4.3kg LOW,LOW

*Porcine Health Management 2023