방역용
소독제

동물용의약외품
(허가번호 제528-001호)

그린 가드액



축사 환경을 위한 구연산 기반 소독 솔루션!
환경 친화적인 강력 세균&바이러스 박멸 천연소독제!



그린가드액 희석 비율별 pH 변화

그린가드 희석비율	pH 변화 (희석 후)	수돗물 pH
원액	0.86	7.4
10배	1.83	7.4
100배	2.27	7.4
1000배	2.92	7.4

(포장단위 1L)

1. 세균
: 살모넬라균, 클로스트리디움균

2. 바이러스
: 조류 인플루엔자 바이러스

3. 사용환경
: 빈 축사, 축산 기구 소독

VITABIO, INC.
(주)비타바이오

그린가드액

동물용의약외품 • 방역용 소독제
(허가번호 제528-001호)

성분명	함 량	특 징
구연산 (Citric acid monohydrate)	500g (본제 1 kg 중)	- 금속이온과 결합하여 미생물 대사에 필요한 이온 제거 - 세균 세포막 투과성 증가로 세포 파괴 - Ph 3 이하로 감소 - 대부분의 박테리아, 곰팡이 및 바이러스 증식 억제

01. 제품정보

유효성분	시트르산수화물 500g/L
제형 및 성상	액제, 미황색의 액체
포장단위	1L/병
저장 • 사용기간	실온(1~30°C), 직사광선 차단 • 제조일로부터 12개월

02. 병원체별 권장희석배수

1) 아래 표의 배율로 희석하여 소독하십시오.
2) 소독대상이 충분히 젖도록 고르게 살포하십시오.
3) 대상동물에 직접 적용하는 제품이 아니며, 반드시 빈 축사, 빈 계사 및 빈 우사 등 대상동물이 없는 상태에서 사용하십시오.

소독환경	대상질병명	살모넬라균	클로스트리디움균	조류 인플루엔자
유기물이 적은 소독대상	일반세균 + 특정병원체	4배	4배	240배
유기물이 많은 소독대상	일반세균 + 특정병원체	3.2배	1.6배	160배

* 단, 여러질병에 대해 동시에 소독할 경우에는 가장 낮은 희석배수(고농도)로 사용할 것
- 유기물이 적은 소독대상 : 축사공간 및 기구 등
- 유기물이 많은 소독대상 : 축사바닥, 오물, 사체, 농장차량 및 운반용구 등

03. 사용 시 주의사항

1) 대상 동물이 없는 빈 축사에서 사용
2) 다른 소독제와 혼합 금지
3) 희석액은 가급적 당일 사용
4) 소독 후 충분히 건조, 환기 후 입식
5) 강산성 제제이므로 피부 및 눈 접촉 주의. 피부 및 눈에 묻으면 즉시 충분한 물로 세척 후 의사의 진료를 받을 것

본 사 | 세종특별자치시 집현중앙 4로 88 비타바이오빌딩 6층
연구소 | 세종특별자치시 집현중앙 4로 88 비타바이오빌딩 4층
공 장 | 세종특별자치시 집현중앙 4로 88 비타바이오빌딩 1층
TEL. 044_850_3200 **FAX.** 044_850_3201 www.vitabio.net

VITABIO, INC.
(주)비타바이오